

METOLACLORO SAA
Metolaclo 96% EC

Cultivo	Maleza	Dosis	Momento de Aplicación
Girasol	Capín o pata de gallo (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Cebollín (<i>Cyperus rotundus</i>) Cola de zorro (<i>Setaria spp.</i>) Gramma carraspera (<i>Eleusine indica</i>) Gramilla (<i>Eragrostis virescens</i>) Pasto de cuaresma (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Sorgo de Alepo de semilla (<i>Sorghum halepense</i>)	Dosis según tipo de suelo: 1-Suelos livianos: 1 L/ha + 1 L/ha de Fluorocloridona 25% 2-Suelos Medianos: 1,25 L/ha + 1,25 L/ha de Fluorocloridona 25% 3-Suelos pesados: 1,5 L/ha + 1,5 L/ha de Fluorocloridona 25%	<p>Maíz, Girasol y Maní: Debe ser aplicado después de la siembra y antes que las malezas hagan su aparición sobre el terreno, preferiblemente sobre suelo húmedo antes o después de una lluvia o de un riego sobre un suelo bien desmenuzado y sin terrones. Para el control de Cebollín (<i>Cyperus esculentus</i> o <i>Cyperus rotundus</i>):</p> <p>1- Realizar un buen control previo durante la primavera para romper cadenas de rizomas y permitir la brotación uniforme.</p> <p>2- Aplicar 1,6 L/ha del producto sobre el suelo refinado y sin malezas e incorporar con rastra de doble acción para permitir la activación del producto. La profundidad de trabajo debe ser mayor a 10 cm.</p> <p>3- Incorporar nuevamente a los 10 días y al sesgo de la anterior.</p>
Maíz	Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Yuyo colorado (<i>Amaranthus sp.</i>)	Dosis según tipo de suelo: 1-Suelos livianos: 0,93 L/ha + 1,4 Kg/ha de Atrazina 90% 2-Suelos Medianos: 1,1 L/ha + 1,6 Kg/ha de Atrazina 90% 3-Suelos pesados: 1,3 L/ha + 2 Kg/ha de Atrazina 90%	
Maní		0,8 l/ha + 1 l/ha de Imazetapyr 10%	
Poroto		0,8 l/ha	

