

LA TIJERETA ATRAZINA 90

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO.

Herbicida selectivo para el control de malezas de hoja ancha y gramíneas anuales en los cultivos de maíz, sorgo granífero, caña de azúcar.



COMPOSICIÓN

Atrazina [2,cloro-4-(etilamino)-6-(isopropilamino)s-triazina]	90 g.
Inertes, c.s.p.	100 g.

- No requiere pre-mezcla, debiéndose agregar solamente agua, aplicándose con pulverizadores comunes en herbicidas.
- Es absorbido principalmente por las raíces y también penetra a través de las hojas translocándose por el interior de las plantas.
- Es selectivo debido a la resistencia de los cultivos en los que se usa, pues estos rápidamente metabolizan el herbicida transformándolo en compuestos no tóxicos.
- No es volátil, evitándose daños en cultivos susceptibles.

MAÍZ

Dosis: kg/ha según el tipo de suelo y cobertura.

Tratamiento	Liviano		Medio		Pesado	
	Total	Banda*	Total	Banda*	Total	Banda*
Pre-siembra	2.2	–	2.8	–	2.8	–
Pre-emergencia	1.8	1.1	2.2	1.3	2.8	2.0
Post-emergencia	2.2	–	2.2	–	2.2	–

*Banda de 35 cm. Zona maicera de Buenos Aires y Santa Fe. En las siembras tempranas (septiembre) o épocas de escasas lluvias, realizar tratamiento de pre-siembra incorporando el herbicida. En las siembras normales (fin de septiembre/octubre) aplicar en pre-emergencia.

SORGO GRANÍFERO

Dosis: kg/ha según el tipo de suelo.

Tratamiento	Medio	Pesado
Pre-siembra	1.5	2.0
Pre-emergencia	1.2 – 2.0	1.2 – 2.0

*Efectuar aplicaciones preferentemente en pre-siembra incorporando ATRAZINA LA TIJERETA 90 2 a 3 semanas antes de la siembra o en su defecto en post-emergencia temprana (cultivo 3-4 hojas).

Recomendamos precaución en aplicaciones de pre-emergencia luego de sembrar y cuando esta coincide con bajas temperaturas y precipitaciones abundantes, puesto que puede presentarse fitotoxicidad sobre todo en suelos livianos.

CAÑA DE AZÚCAR

Dosis: kg/ha según el tipo de suelo.

Tratamiento	Liviano		Pesado	
	Total	Banda*	Total	Banda*

Caña plantao
Soca

3.3

22g / surco

3.3

22g / surco

*Banda de 70 cm por surco de 100 m de largo.

Pre-emergencia después de un riego o una lluvia. Post-emergencia de los brotes hasta que las malezas latifoliadas tengan 1 a 2 hojas.