

Arsenal Forestal®

Herbicida

Cultivo	Malezas	Dosis	Recomendaciones
Pino taeda (<i>Pinus taeda</i>) 	Charrúa (<i>Mikania micrantha</i>), Pasto de cuaresma (<i>Digitaria sanguinalis</i>), María mola (<i>Senecio brasiliensis</i>), Pasto bandera (<i>Digitaria insularis</i>), Peludilla (<i>Gnaphalium spicatum</i>), Paitén (<i>Setaria geniculata</i>), Pasto yacaré (<i>Paspalum paniculatum</i>), Pasto jesuita (<i>Axonopus compressus</i>), Fumo bravo (<i>Solanum granuloso</i>), Setaria (<i>Setaria poiretania</i>).	0,75-1 l/ha	Dejar transcurrir, entre la aplicación y la plantación, un período de 15-30 días (no plantar si no ha transcurrido un período mínimo de 15 días luego de la aplicación). Aplicar en suelo preparado, con maleza emergida y listo para ser plantado.

Recomendación de uso: Aplicar en postemergencia de las malezas y preplantación del cultivo de pino taeda.

Esta recomendación está destinada a la zona de Misiones y norte de Corrientes, que se caracteriza por presentar suelos arcillosos, de PH ácido, bien drenados y de color rojo intenso.