







Cultivo	Enfermedades	Dosis	Tiempo de carencia	Recomendaciones
Trigo 	Roya de la hoja (<i>Puccinia recondita</i>), Septoriosis de la hoja (<i>Septoria Tritici</i>), Mancha amarilla (<i>Dreschlera tritici repentis</i>)	1 l/ha		Aplicar ante la aparición de los primeros síntomas o preventivamente en Zadocks 39.
Maíz 	Roya del maíz (<i>Puccinia sorghi</i>)	0,75 l/ha	30 días	Aplicar ante la aparición de los primeros síntomas (monitorear desde 6-7 hojas hasta inicio de floración).
Maní 	Viruela temprana (<i>Cercospora arachidicola</i>), Viruela viruela tardía (<i>Cercosporidium personatum</i>)	0,75 l/ha		Iniciar los tratamientos ante la aparición de las primeras manchas. Realizar la 2ª aplicación con un intervalo de 28 días.
Soja 	Enfermedades de fin de ciclo: Mancha marrón (<i>Septoria glycines</i>), Mancha púrpura (<i>Cercospora kikuchii</i>), Antracnosis (<i>Colletotrichum truncatum</i>), Mancha ojo de rana (<i>Cercospora sojina</i>), Phomosis (<i>Diaporthe phaseolorum</i>), Mancha anillada (<i>Corynespora casicola</i>), Mildew (<i>Peronospora manshurica</i>), Roya asiática de la soja (<i>Phakopsora pachyrhizi</i>)	0,5 l/ha		Aplicar desde R3 (inicio de formación de vainas) hasta R5.4 (50 % llenado de granos). Aplicando en R3 se logra un mayor control de las enfermedades de fin de ciclo y un mayor aumento en los rendimientos.
	Roya asiática de la soja (<i>Phakopsora pachyrhizi</i>)			Aplicar preventivamente en estadio del cultivo R3-R4 (finales de floración, inicio de llenado de granos). De observarse síntomas de la enfermedad, realizar la aplicación al inicio de floración (R1).
Ajo 	Roja del ajo (<i>Puccinia allii</i>)	1 l/ha	30 días	Aplicar ante la aparición de los primeros síntomas o en forma preventiva, desde el estado fenológico: 10-11 hojas. Tener en cuenta la sensibilidad varietal, que es mayor en ajos morados o chinos. Son condiciones predisponentes a la enfermedad las primaveras frescas, lluviosas o con alta humedad relativa, y la formación de rocío.
Girasol 	Roya blanca (<i>Albugo tragopogonis</i>), Roya negra (<i>Puccinia helianthi</i>), Escudete negro o Mancha del tallo (<i>Phoma macdonaldii</i>), Mancha de la hoja (<i>Alternaria helianthi</i>)	0,75 l/ha		Aplicar ante la aparición de los primeros síntomas, desde el estado R1 (estrella) hasta la floración.