BIDÓN ROMANO COEX POR 10 LITROS

PRECAUCIONES
• MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
• NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
• INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
• EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.
• EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO CONFORME A LA/S NORMATIVA/S PROVINCIALES Y MUNICIPALES CORRESPONDIENTES.
• PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Mezclar el producto al aire libre. No aspirar el líquido ni la neblina pulverizada. Evitar el contacto con la piel y ojos y la contaminación de alimentos. Utilizar ropa protectora adecuada, botas de goma, protección facial, antiparras y guantes impermeables. No comer, beber o fumar durante el trabajo. Después del trabajo diario, lavarse cuidadosamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan podido tomar contacto con el producto. **RIESGOS AMBIENTALES: Toxicidad para abejas:** Virtualmente no tóxico. **Toxicidad para aves:** Prácticamente no tóxico. **Toxicidad para peces:** Ligeramente tóxico. No contaminar fuentes de agua. Se debe dejar una franja de seguridad entre el área tratada y los cursos y espejos de agua (mínimo 50 metros). Ámbito de aplicación: Se puede aplicar solo en zonas agrícolas, en los cultivos y usos recomendados en la etiqueta y lejos de lugares donde haya tránsito frecuente de personas. **TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN:** Los envases vacíos o con pequeños remanentes deben ser enjuagados tres veces con agua, para extraer todo el producto (TRIPLE LAVADO). Volcar el líquido de lavado en el tanque de la pulverizadora antes de su aplicación. Esparcir el agua de lavado debajo de alambrados o en las banquinas, siempre y cuando se encuentren alejados de viviendas, centros poblados y lugares de tránsito frecuente de personas.Los envases que queden con producto remanente por una utilización parcial de su contenido deben ser cerrados con la correspondiente tapa y almacenados de acuerdo a las indicaciones que se especifican en ítem "Almacenamiento". **TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS:** Verificar que estén vacíos, proceder al triple lavado e inutilizar los envases perforándolos, para evitar su reutilización. Colocarlos transitoriamente en contenedores y en un lugar seguro hasta su traslado a una planta autorizada para la destrucción definitiva. **ALMACENAMIENTO:** Almacenar en lugar seco, fresco y bien ventilado. Almacenar en los recipientes originales cerrados y en un lugar apropiado para el depósito de productos fitosanitarios, bien cerrado y aislado del alcance de los niños, personas inexpertas y animales domésticos. Mantener apartado de semillas, fertilizantes y alimentos a efectos de prevenir la contaminación de éstos como también del agua de riego y de consumo. **DERRAMES:** Contener el producto derramado con material absorbente (por ej.; arena, tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos, etc.) e introducirlo en recipientes cerrados para su posterior destrucción, según normativas legales. El producto derramado no puede ser reutilizado. No contaminar las aguas ni desagües. **PRIMEROS AUXILIOS:** Llevar al paciente a un sitio con aire fresco y procurar ayuda médica inmediata. En caso de ingestión dar de beber gran cantidad de agua. No provocar el vómito y llamar al médico. En caso de contacto con la piel y ojos, lavar con abundante agua limpia por 15 minutos y llamar al médico. En todos los casos acudir al médico llevando la etiqueta del producto.

ADVERTENCIAS PARA EL MÉDICO: Clase III. Producto ligeramente peligroso. No existe antídoto específico. En caso de ingestión realizar lavaje gástrico, posteriormente puede administrarse una suspensión de carbón activado y un purgante salino. Aplicar tratamiento sintomático y de sostén. Solvente: Aromático. Irritación Ocular: Severo irritante ocular (Precaución), Categoría II: Causa daño temporal a los ojos, Irritación Dermal: Moderado irritante dermal (Cuidado), Categoría III: Evitar contacto con la piel y la ropa, Categoría inhalatoria III: Cuidado, Sensibilización dermal: No sensibilizante dermal. Grupo químico: Ciclohexanodiona oxima o Ciclohexanona.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Los signos y síntomas de los efectos sobre el sistema nervioso central pueden incluir uno o más de los siguientes: dolores de cabeza, mareos, pérdida del apetito, debilidad y pérdida de la coordinación. La irritación moderada ocular provoca: dolor, lágrimas, hinchazón, irritación y visión nublada. Y en caso de irritación dermal provoca dolor o una sensación de calor, decoloración, hinchazón y ampollas.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: CABA: Div. Toxicología del Htal. de Clínicas - Tel.: (011) 5950-8804/06. Htal. Italiano de Bs. As. - Tel.: (011) 4959-0311/0313 / 0800-444-4400. Htal. de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez" - Tel.: (011) 4962-6666. Htal.de Niños "Dr. Pedro de Elizalde" - Tel. (011) 4300-2115 / 4307-5842. Htal. Escuela "J. de San Martín" - Tel.: (011) 4505-3931 / 5950-8000. **Prov. de Buenos Aires: Haedo:** Htal. Nac. "Prof. A. Posadas" - Tels.: (011) 4658-7777 / 4654-6648 / 4469-9300 int. 1102 / 0800- 333-0160. **La Plata:** Htal. Interzonal de Agudos Esp. en Pediatría "Sor María Ludovica" - Tel.: (0221) 451-5555 / 453-5901 int. 1312 / 0800-222- 9911. **Pergamino:** Htal. Interzonal de Agudos San José - Tel.: (02477) 429792/93 int. 259. **Prov. de Santa Fe: Rosario:** Htal. "J. M. Cullen" - Tel.: (0342) 457-3357 int. 2678. Centro de Toxicología TAS -Tucumán 1544 - Tel.: (0341) 424-2727 / 0800-888-TOXICO. **Prov. de Córdoba: Córdoba:** Htal. de Urgencias - Tel.: (0351) 427-8200. Htal. de Niños - Tel.: (0351) 458-6400. **Prov. de Mendoza: Mendoza:** Htal. Central - Tel.: (0261) 420-0600. **Provincia de Chaco: Resistencia:** Htal. "J.C. Perrando" - Tel.: (03722) 425050/7233 / 442399. **Prov. de Neuquén: Neuquén:** Htal. Regional - Tel.: (0299) 449-0800/449-0890.

HERBICIDA

GRUPO: A

Lord®

Concentrado Emulsionable

COMPOSICIÓN:

cletodim: (E,E)-(+/-)-2-[(1-[[[3-cloro-2-propenil)-oxi]imino]-propil)]-5-[[2-(etiltio)- propil]]-3-hidroxi-2-ciclohexeno-1 -ona ..... 24 g
solventes y emulsionantes, c.s.p. ..... 100 ml

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
Inscripto ante el SENASA bajo el Nº 37,245

Arysta LifeScience

CONT. NETO:

10 Litros

ORIGEN: ARGENTINA

Lote Nº: Ver envase.
Fecha de Vencimiento: Ver envase.

INFLAMABLE DE 3ª CATEGORÍA

Registrado por: ARYSTA LIFESCIENCE ARGENTINA S.A.
Av. De Los Lagos 6855 Ed. Puerta Norte II, Piso 5°, Of. 522 (B1670) Nordelta - Partido Tigre - Prov. Bs. As. Tel: (+5411) 4871-3779 / 4871-5923 www.arystalifescience.com.ar

Responsabilidad Legal: Arysta LifeScience Argentina S.A. garantiza el contenido, calidad, estabilidad y la composición del producto en su envase cerrado y hasta la fecha de su vencimiento. Sin embargo en el uso, la aplicación y/o almacenaje pueden intervenir factores que escapen a nuestro control, en consecuencia, la empresa no se hace responsable por los daños causados por el incumplimiento total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.

CUIDADO

GENERALIDADES DEL PRODUCTO:
LORD® es un herbicida selectivo, postemergente y sistémico, para el control de malezas gramíneas anuales: Capín *(Echinochloa crus-galli)*, Pata de perdiz o Pasto cuaresma *(Digitaria sanguinalis)*, Sorgo de Alepo de semilla *(Sorghum halepense)*, Pie de gallina *(Eleusine indica)*, Trigo guacho *(Triticum spp.)* y Maíz guacho RR/RR2 *(Zea mays)*, y gramíneas perennes: Sorgo de Alepo de rizoma *(Sorghum halepense)*, Pasto puna *(Stipa brachychaeta)* y Gramón o Pasto bermuda *(Cynodon dactylon)* en los cultivos de Alfalfa, Algodón, Girasol, Maní, Papa, Poroto, Cebolla y Soja convencional y RR. LORD® no controla malezas de hoja ancha ni Ciperáceas.

LORD® se absorbe rápidamente por el follaje y se transloca por floema y xilema, acumulándose en las regiones meristemáticas de las hojas, tallos y raíces y provocando una rápida detención del crecimiento de las malezas. En 3-4 días se produce una clorosis de las malezas y la muerte de los tejidos meristemáticos. A continuación se destruyen los tejidos, aparece una coloración rojiza a morada y finalmente ocurre la muerte de las malezas. La acción total demora entre 7 y 14 días.
LORD® inhibe la enzima ACCasa (Acetil-CoA carboxilasa), responsable de la síntesis de ácidos grasos (compuestos básicos de las paredes celulares) en especies de gramíneas. Esto no se produce en las especies de latifoliadas, por lo cual resulta totalmente selectivo en cultivos de hoja ancha. LORD® inhibe la división celular y la formación de cloroplastos y reduce la respiración. LORD® se degrada rápidamente en el suelo por actividad microbiana y por lo tanto no deja ningún tipo de residuos para cultivos posteriores.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:
PREPARACIÓN: LORD® debe ser aplicado preferentemente con buenas condiciones de humedad en el suelo y con la maleza en activo crecimiento a los efectos de que se produzca una buena translocación del mismo hacia los puntos de crecimiento. No se recomienda aplicar en condiciones de sequía prolongada.
Preparación de la dilución: Completar con agua el tanque del equipo aplicador hasta la mitad de su capacidad. Verter la dosis indicada de LORD® con los agitadores en marcha. Posteriormente incorporar la dosis de coadyuvante COMPANION® y finalmente completar el resto del tanque con agua, manteniendo siempre los agitadores en marcha. Una vez preparada la dilución de LORD®, deberá utilizarse ese mismo día.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:
Puede ser aplicado tanto con equipos terrestres convencionales para herbicidas como por avión. Volúmenes de aplicación:
Terrestres: entre 100 y 150 l/ha (normalmente se utilizan los volúmenes menores en mezclas de tanque de LORD® + Glifosato).
Aéreos: no menos de 25 l/ha. En todos los casos se debe tratar de lograr una cobertura mínima de 20 a 30 impactos (gotas) por cm² de 200 a 300 micrones de diámetro. La presión de trabajo ideal para LORD® es de 40 a 60 lb/pg².
Tipo de pastillas: Abanico plano.
Tipo de agua (pH): Ajustar siempre el pH del agua cercano a 6 para maximizar la actividad de LORD®. La actividad del producto aumenta con la reducción del pH.
Coadyuvantes: Todos los tratamientos deben llevar el agregado de COMPANION® al 0,5-0,75% de concentración (0,5-0,75 l/ha por cada 100 litros de agua). La concentración menor corresponde a condiciones de buena humedad y la concentración mayor a condiciones de sequía. El agregado de coadyuvante es fundamental para mejorar la emulsibilidad de LORD® en agua, reducir la tensión superficial de las gotas del pulverizado, permitir un mejor mojado del follaje y lograr una mejor absorción de LORD® a través de la cuticula de las hojas.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	MALEZA	DOSIS (cm3/ha)	MOMENTO DE APLICACIÓN
Alfalfa **Algodón** **Girasol** **Maní** **Papa** **Soja** **Soja RR** **Poroto**	Capín *(Echinochloa crus-galli)*, Pasto cuaresma *(Digitaria sanguinalis)*, Pie de gallina *(Eleusine indica)*, Sorgo de Alepo de semilla *(Sorghum halepense)*, Trigo guacho *(Triticum spp.)*	400 - 650	Aplicar a partir de 3 hojas verdaderas hasta macollaje, con la maleza en activo crecimiento.
	Sorgo de Alepo de rizoma *(Sorghum halepense)*, Pasto puna *(Stipa brachychaeta)*	650 - 1.000	Aplicar con la maleza en activo crecimiento y un tamaño máximo de 30 - 40 cm de altura.
	Gramón *(Cynodon dactylon)*	1.200 - 1.400	Aplicar sobre estolones de hasta 15 cm de largo y desarrollo foliar menor a 10 cm de altura, estando la maleza en activo crecimiento.
Soja **Soja RR**	Maíz guacho RR/RR2 *(Zea mays)*	400 - 600	Utilizar la dosis de 400 cm3/ha en plantas de maíz en estado de desarrollo V2 a V6 y la dosis de 500 a 600 cm3/ha en estado de desarrollo de V6 a V8.
Cebolla	Capín *(Echinochloa crus-galli)*, Cola de Zorro *(Setaria verticillata)*, Gramón gramilla, Pasto bermuda, Pata de perdiz *(Cynodon dactylon)* Paja vizcachera *(Stipa spp.)* Pelo de chancho *(Distichlis spicata)* Sorgo de Alepo de semilla *(Sorghum halepense)*.	1.000	Aplicar con las malezas en activo crecimiento.
Barbecho Químico	Capín *(Echinochloa crus-galli)*,Cola de zorro *(Setaria verticillata)*, Pasto cuaresma *(Digitaria sanguinalis)*, Pata de gallina *(Eleusine indica)*, Sorgo de Alepo de semilla, *(Sorghum halepense)*, Trigo guacho, *(Triticum spp.)*, Maíz guacho *(Zea mays)*.	400 700	Estadios vegetativos tempranos hasta emisión temprana de macollos. Expansión vegetativa con folíolos extendidos entre 5-15 y 10-30 cm de altura.
	Pelo de chancho *(Distichlis spicata)*, Sorgo de Alepo de rizoma *(Sorghum halepense)*, Pasto puna *(Stipa brachychaeta)*.	600 1.000	Estadios vegetativos tempranos hasta emisión temprana de macollos. Expansión vegetativa con folíolos extendidos entre 5-15 y 10-30 cm de altura.
	Gramón *(Cynodon dactylon)*.	1.200 1.400	Estadios vegetativos tempranos hasta emisión temprana de macollos. Expansión vegetativa con folíolos extendidos entre 5-15 y 10-30 cm de altura

RESTRICCIONES DE USO: No se recomienda aplicar en condiciones de sequía prolongada. No aplicar con vientos > 10 km/h. Para el cultivo de Papa en el Sudeste Bonaerense, no se recomienda la aplicación aérea, dado que las derivas eventualmente producidas por la misma, podrían afectar a los cultivos de trigo, maíz y sorgo de la zona. En el caso de aplicación terrestre, se advierte de esta situación a los usuarios para que de esta manera se extremen las precauciones y la aplicación sea realizada de acuerdo a las condiciones meteorológicas que se indican para una buena práctica de pulverización. En todos los casos se debe evitar todo tipo de deriva hacia cultivos sensibles tales como cereales de invierno (trigo, cebada, centeno, avena), cereales de verano (maíz, sorgo, mijo) y gramíneas forrajeras.
Cultivos rotacionales: Después de una aplicación de LORD® no hay restricciones para la siembra de cualquier cultivo ni tampoco en la temporada siguiente a una aplicación del producto, ya que Cletodim se mineraliza completamente en el suelo a CO_2.
Tiempo de carencia: Entre una aplicación de LORD® y la cosecha dejar transcurrir los siguientes períodos de tiempo según cultivo:
Girasol 100 días - Poroto 55 días - Maní 45 días - Algodón 60 días - Soja 80 días - Soja RR 80 días - Papa 45 días - Alfalfa 14 días - Cebolla 60 días.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
Período de reingreso al área tratada: Se puede reingresar al área tratada a las 12 horas de aplicado LORD®
COMPATIBILIDAD: LORD® es totalmente compatible con diferentes formulaciones de glifosato en mezclas de tanque, habiendo observado un efecto sinérgico para el control de las malezas. La mezcla de tanque con glifosato solo se podrá utilizar en cultivos resistentes a este activo debiendo agregar en primer lugar el glifosato seguido de LORD®. No se recomienda mezclar LORD® con productos de reacción alcalina. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa en pequeña escala para mezclas con otros productos tales como fungicidas e insecticidas.
FITOTOXICIDAD: LORD® es totalmente selectivo a las dosis y en los cultivos recomendados en la etiqueta.
Para evitar cualquier riesgo de fitotoxicidad en los cultivos recomendados, se aconseja no mezclar con coadyuvantes diferentes a los indicados en la etiqueta.
AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.
® Marca registrada de Arysta LifeScience Argentina S.A.