



Control de Yuyo colorado resistente (*Amaranthus quitensis*)

Cultivo	Malezas	Dosis	Recomendaciones
Maíz Clearfield® 	Yuyo colorado (6) (<i>Amaranthus quitensis</i>) resistente	85-114 g de OnDuty®/ha + 1,1 kg/ha atrazina 90 % ó 85-114 g de OnDuty®/ha + 2 l/ha atrazina 50 %	Aplicar en pre y postemergencia de cultivo y maleza.

(6) El uso de OnDuty® en mezcla de tanque con atrazina a la dosis recomendada, en pre y postemergencia de maíz Clearfield® controlará el Yuyo colorado resistente que aún no ha emergido y hasta el 1º par de hojas verdaderas. El maíz Clearfield® no deberá tener más de 6 hojas desplegadas.

Control de Pata de gallina (*Eleusine indica*)

Cultivo	Malezas	Dosis	Recomendaciones
Maíz Clearfield® 	Pata de gallina (<i>Eleusine indica</i>)	85-114 g de OnDuty®/ha + 3 l/ha Herbadox® (7) ó 85-114 g de OnDuty®/ha + 1,5 l/ha acetoclor con protector ó 85-114 g de OnDuty®/ha + 1,3 l de metalocloro	Aplicar en pre y postemergencia de cultivo y maleza.

(7) No usar en suelos arenosos o con menos de 1,5 % de materia orgánica. Sembrar el maíz a 4-5 cm de profundidad.

La aplicación de OnDuty® debe estar acompañada de la adición de un humectante no iónico al 0,5% v/ v.